

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q28d. Parmi les actes suivants, lesquels accomplissez-vous dans le cadre de votre pratique? Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.

Question posée aux MF/omnipraticiens seulement	Médecins de famille			Tous les MFs
	CCMF n=2054 N=16227	non-CCMF n=1787 N=13113	CCMF(MU)* n=176 N=1468	Total n=3841 N=29339
	%	%	%	%
Incision et drainage d'abcès	82,2%	69,8%	90,8%	76,6%
Sutures et réparations de lacération	77,8%	64,9%	89,0%	72,0%
Installation d'un plâtre pour une fracture	37,3%	26,8%	84,3%	32,6%
Cryothérapie de lésions cutanées	70,1%	55,2%	35,3%	63,5%
Excision de lésions cutanées	61,2%	50,4%	49,7%	56,4%
Grattage cutané pour prélever un champignon	59,4%	45,6%	38,9%	53,2%
Utilisation d'une lampe de Wood	25,0%	20,1%	26,4%	22,8%
Drainage d'un hématome sous-unguéal	73,9%	65,1%	88,8%	69,9%
Drainage d'un périonyxis aigu	65,7%	56,4%	87,5%	61,6%
Exérèse d'une callosité cutanée	65,3%	51,4%	42,3%	59,1%
Anesthésie locale par infiltration	80,2%	68,6%	88,1%	75,0%
Exérèse d'un corps étranger de la cornée ou de la conjunctive	63,7%	58,9%	87,2%	61,6%
Exérèse de cérumen ou lavage du canal auditif	88,2%	77,8%	86,0%	83,6%
Cautérisation du nez suite à un épistaxis antérieur	61,4%	48,9%	83,5%	55,8%
Retirer un corps étranger	73,2%	65,1%	88,2%	69,6%
Insertion d'une sonde nasogastrique	35,5%	28,1%	79,2%	32,2%
Recherche de sang occulte dans les selles	63,9%	53,4%	82,3%	59,2%
Insertion d'un cathéter transurétral	34,7%	29,4%	73,5%	32,3%
Cryothérapie ou chimiothérapie des condylomes	65,0%	50,2%	31,9%	58,4%
Test de Papanicolaou	78,6%	71,7%	33,8%	75,5%
Forceps bas	5,2%	6,0%	2,0%	5,5%
Forceps moyen et rotation	,5%	1,2%	,0%	,8%
Ventouse obstétricale	12,6%	8,5%	4,8%	10,8%
Pose d'une attelle sur un membre fracturé	53,3%	43,2%	84,2%	48,8%
Ventilation avec masque et ballon	41,6%	32,4%	81,9%	37,5%
Ponction veineuse	43,3%	38,8%	77,2%	41,3%
Injection sous-cutanée	84,7%	78,5%	83,9%	82,0%
Injection intramusculaire	86,4%	80,7%	86,1%	83,8%
Insertion d'un cathéter intraveineux périphérique chez un adulte et un enfant	27,9%	26,3%	68,1%	27,2%
Insertion d'un cathéter central chez un adulte	20,2%	11,2%	76,3%	16,2%
Préparation pour transport terrestre ou aérien	22,0%	13,0%	60,7%	18,0%
Acupuncture	2,9%	2,6%	1,6%	2,8%
Hypnose	1,8%	1,8%	,2%	1,8%
Aucune des réponses ci-dessus	1,8%	5,6%	,3%	3,5%
NR	3,0%	3,5%	5,3%	3,2%

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.

Cette question a été posée seulement aux médecins de famille/omnipraticiens répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.