

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q20. Veuillez indiquer avec qui vous ne collaborez pas. Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes	Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges						Tous les médecins
	MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=3197 N=26059	Homme n=4352 N=35865	Femme n=2545 N=18467	NR n=141 N=1066	<35 n=551 N=4176	35-44 n=1723 N=14338	45-54 n=2169 N=18017	55-64 n=1679 N=12807	65+ n=815 N=5314	NR n=101 N=745	Total n=7038 N=55398
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ne collabore pas avec des médecins de famille	4,3%	9,7%	7,3%	6,1%	2,6%	4,9%	7,2%	8,0%	6,5%	4,5%	4,8%	6,8%
Ne collabore pas avec des infirmières praticiennes	43,3%	37,1%	39,0%	43,4%	35,4%	52,0%	43,9%	40,6%	38,3%	26,8%	32,6%	40,4%
Ne collabore pas avec des infirmières en psychiatrie	40,8%	46,1%	41,7%	46,7%	36,0%	53,2%	48,2%	43,9%	40,6%	27,3%	37,6%	43,3%
Ne collabore pas avec d'autres infirmières (p. ex.: inf. aut., inf. aux. aut.)	15,8%	14,5%	14,4%	16,7%	16,0%	11,7%	13,7%	14,8%	18,2%	15,3%	19,1%	15,2%
Ne collabore pas avec des adjoints au médecin	55,1%	50,2%	50,8%	57,1%	46,5%	64,6%	59,1%	54,0%	49,0%	32,0%	50,8%	52,8%
Ne collabore pas avec des diététistes et nutritionnistes	6,1%	13,9%	10,2%	9,1%	8,2%	6,6%	9,1%	8,8%	10,1%	15,6%	16,5%	9,8%
Ne collabore pas avec des ergothérapeutes	21,2%	28,5%	24,3%	25,6%	22,4%	28,3%	27,1%	25,5%	22,2%	18,4%	21,4%	24,6%
Ne collabore pas avec des physiothérapeutes	10,5%	27,9%	18,9%	18,3%	19,8%	19,1%	19,8%	18,6%	17,9%	16,9%	20,0%	18,7%
Ne collabore pas avec des chiropraticiens	41,8%	57,8%	48,4%	51,4%	46,0%	62,9%	55,7%	48,0%	46,3%	34,0%	46,0%	49,4%
Ne collabore pas avec des psychologues	23,4%	37,0%	31,5%	26,7%	26,7%	40,1%	36,4%	28,8%	24,4%	19,3%	35,1%	29,8%
Ne collabore pas avec des conseillers en santé mentale	28,9%	45,2%	36,7%	36,8%	28,7%	47,1%	42,2%	36,7%	32,7%	22,7%	34,0%	36,6%
Ne collabore pas avec des conseillers en toxicomanie	34,9%	49,9%	40,9%	44,2%	37,2%	53,4%	49,9%	41,7%	36,7%	25,5%	39,1%	42,0%
Ne collabore pas avec des travailleurs sociaux	17,3%	23,3%	20,7%	19,0%	17,7%	22,8%	21,8%	21,0%	19,0%	13,9%	13,8%	20,1%
Ne collabore pas avec des pharmaciens	6,6%	15,4%	11,2%	9,9%	11,6%	10,7%	11,3%	10,7%	11,0%	9,4%	8,3%	10,8%
Ne collabore pas avec des sages-femmes	53,5%	53,6%	52,9%	55,0%	51,5%	66,3%	58,7%	53,5%	51,2%	36,2%	49,9%	53,6%
Ne collabore pas avec des orthophonistes	33,3%	42,4%	37,8%	37,7%	30,8%	47,3%	40,8%	38,5%	34,6%	25,7%	35,3%	37,6%
Ne collabore pas avec des podiatres	43,5%	56,8%	48,6%	52,2%	45,5%	63,4%	57,7%	49,2%	44,5%	32,1%	48,8%	49,7%
Ne collabore pas avec des praticiens de médecine complémentaire ou parallèle	52,9%	57,9%	54,4%	57,1%	51,3%	69,2%	62,0%	54,3%	51,9%	37,4%	54,4%	55,2%
NR aux questions ci-dessus	1,4%	2,4%	1,9%	1,7%	3,6%	1,0%	1,5%	1,5%	1,9%	4,7%	0%	1,8%
Aucune collaboration	30,4%	28,9%	31,5%	26,1%	32,7%	20,9%	25,4%	29,5%	32,1%	43,1%	32,7%	29,7%

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.