

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q28d. Parmi les actes suivants, lesquels accomplissez-vous dans le cadre de votre pratique? Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.

Question posée aux MF/omnipraticiens seulement	Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MF/omni
	MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=0 N=0	Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Incision et drainage d'abcès	76,6%	,0%	79,4%	71,9%	85,0%	86,7%	80,4%	76,5%	71,8%	65,5%	79,9%	76,6%
Sutures et réparations de lacération	72,0%	,0%	75,4%	66,4%	77,6%	84,4%	77,5%	70,6%	66,7%	60,1%	70,9%	72,0%
Installation d'un plâtre pour une fracture	32,6%	,0%	38,2%	24,0%	27,5%	49,9%	37,8%	30,7%	26,1%	22,0%	26,9%	32,6%
Cryothérapie de lésions cutanées	63,5%	,0%	62,7%	64,8%	62,2%	74,3%	66,4%	65,8%	57,8%	46,7%	57,5%	63,5%
Excision de lésions cutanées	56,4%	,0%	60,6%	49,4%	65,0%	65,7%	57,8%	57,4%	53,8%	44,8%	45,7%	56,4%
Grattage cutané pour prélever un champignon	53,2%	,0%	53,6%	52,6%	53,3%	62,3%	55,9%	52,7%	51,7%	41,2%	42,3%	53,2%
Utilisation d'une lampe de Wood	22,8%	,0%	23,7%	21,7%	15,9%	26,4%	21,7%	25,0%	22,2%	13,2%	26,4%	22,8%
Drainage d'un hématome sous-unguéal	69,9%	,0%	74,9%	61,7%	78,4%	68,8%	69,9%	71,3%	70,5%	62,8%	73,5%	69,9%
Drainage d'un périonyxis aigu	61,6%	,0%	67,6%	51,9%	63,8%	62,1%	64,0%	62,6%	59,9%	55,9%	44,8%	61,6%
Exérèse d'une callosité cutanée	59,1%	,0%	60,2%	57,2%	60,7%	60,8%	60,6%	61,1%	56,9%	50,1%	54,0%	59,1%
Anesthésie locale par infiltration	75,0%	,0%	79,1%	68,2%	80,6%	83,7%	79,3%	74,5%	71,4%	63,2%	69,5%	75,0%
Exérèse d'un corps étranger de la cornée ou de la conjonctive	61,6%	,0%	68,7%	50,4%	60,5%	63,9%	60,9%	61,5%	63,0%	55,4%	68,1%	61,6%
Exérèse de cérumen ou lavage du canal auditif	83,6%	,0%	83,4%	83,9%	81,6%	86,7%	84,7%	83,9%	83,1%	75,2%	83,8%	83,6%
Cautérisation du nez suite à un épistaxis antérieur	55,8%	,0%	61,1%	47,4%	54,7%	60,7%	58,9%	55,9%	52,9%	47,9%	52,1%	55,8%
Retirer un corps étranger	69,6%	,0%	74,5%	61,6%	72,7%	75,1%	70,6%	69,4%	69,1%	60,6%	73,7%	69,6%
Insertion d'une sonde nasogastrique	32,2%	,0%	37,9%	23,5%	24,9%	48,6%	39,9%	28,7%	26,1%	20,2%	24,8%	32,2%
Recherche de sang occulte dans les selles	59,2%	,0%	60,9%	55,8%	72,5%	70,8%	59,4%	57,1%	59,0%	54,2%	57,8%	59,2%
Insertion d'un cathéter transurétral	32,3%	,0%	38,3%	22,5%	38,4%	38,1%	36,2%	29,6%	30,4%	28,3%	36,6%	32,3%
Cryothérapie ou chimiothérapie des condylomes	58,4%	,0%	56,5%	61,2%	60,7%	65,0%	60,6%	60,9%	56,1%	38,2%	57,9%	58,4%
Test de Papanicolaou	75,5%	,0%	71,7%	81,8%	72,3%	80,9%	72,1%	77,6%	76,8%	67,7%	73,9%	75,5%
Forceps bas	5,5%	,0%	6,1%	4,7%	3,7%	4,3%	2,5%	5,8%	9,4%	5,3%	3,5%	5,5%
Forceps moyen et rotation	,8%	,0%	1,2%	,1%	1,1%	,3%	,5%	,6%	1,2%	1,7%	,0%	,8%
Ventouse obstétricale	10,8%	,0%	9,3%	12,9%	15,2%	19,2%	10,8%	10,8%	9,5%	3,7%	9,4%	10,8%
Pose d'une attelle sur un membre fracturé	48,8%	,0%	53,7%	41,1%	47,1%	57,4%	52,8%	48,3%	45,0%	37,3%	49,4%	48,8%

(suite)

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q28d. Parmi les actes suivants, lesquels accomplissez-vous dans le cadre de votre pratique? Veuillez cocher toutes les cases pertinentes. (suite)

Question posée aux MF/omnipraticiens seulement	Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MF/omni
	MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=0 N=0	Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ventilation avec masque et ballon	37,5%	,0%	41,4%	31,1%	41,0%	56,6%	42,6%	35,3%	31,6%	23,0%	36,4%	37,5%
Ponction veineuse	41,3%	,0%	47,4%	31,7%	39,0%	41,1%	43,6%	40,3%	40,5%	38,9%	49,5%	41,3%
Injection sous-cutanée	82,0%	,0%	83,7%	79,4%	78,1%	80,0%	82,8%	83,5%	81,2%	75,4%	86,9%	82,0%
Injection intramusculaire	83,8%	,0%	85,2%	81,7%	84,4%	80,7%	84,4%	85,7%	83,6%	77,7%	83,8%	83,8%
Insertion d'un cathéter intraveineux périphérique chez un adulte et un enfant	27,2%	,0%	32,5%	18,9%	24,4%	33,4%	31,4%	26,9%	23,1%	18,9%	23,4%	27,2%
Insertion d'un cathéter central chez un adulte	16,2%	,0%	19,9%	10,4%	12,7%	32,4%	24,5%	13,5%	7,6%	5,0%	15,2%	16,2%
Préparation pour transport terrestre ou aérien	18,0%	,0%	20,1%	14,9%	13,2%	34,9%	25,1%	15,5%	10,4%	7,4%	12,8%	18,0%
Acupuncture	2,8%	,0%	3,4%	1,8%	2,7%	,6%	2,7%	3,5%	2,8%	2,0%	5,7%	2,8%
Hypnose	1,8%	,0%	2,0%	1,5%	2,2%	,1%	,7%	2,0%	2,5%	4,8%	3,3%	1,8%
Aucune des réponses ci-dessus	3,5%	,0%	3,3%	3,8%	2,5%	,2%	2,2%	3,5%	5,0%	8,0%	2,5%	3,5%
NR	3,2%	,0%	3,3%	3,1%	3,1%	3,6%	3,4%	3,1%	2,6%	5,0%	2,9%	3,2%

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux médecins de famille/omnipraticiens répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.