

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle
continue :

| Conférences ou cours agréés | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité de conférences ou cours agréés | Aucune disponibilité | ,4% | ,0% | ,5% | ,0% | ,1% | ,1% | ,2% | ,3% | ,0% | ,1% | ,0% | ,1% |
| | Faible | 5,5% | ,0% | 3,2% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 2,1% | 2,8% | 1,9% | 1,2% | 14,1% | 1,5% |
| | Passable | 8,3% | 3,2% | 4,5% | 5,3% | 4,4% | 5,3% | 6,7% | 6,0% | 4,6% | 5,2% | 2,6% | 5,1% |
| | Bonne | 26,0% | 25,4% | 19,8% | 20,6% | 19,4% | 15,0% | 23,4% | 19,9% | 15,0% | 17,0% | 18,5% | 17,3% |
| | Très bonne | 32,7% | 54,8% | 34,7% | 38,3% | 37,6% | 33,4% | 30,8% | 34,6% | 37,5% | 36,7% | 40,1% | 35,5% |
| | Excellente | 24,1% | 13,8% | 35,1% | 32,6% | 34,3% | 42,2% | 33,4% | 34,4% | 39,8% | 37,7% | 24,7% | 37,9% |
| | N'utilise pas | 1,5% | ,0% | ,2% | ,2% | ,4% | 1,2% | 1,6% | ,8% | ,3% | ,7% | ,0% | ,8% |
| | NR | 1,4% | 2,8% | 2,1% | 1,5% | 2,5% | 1,5% | 1,7% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | ,0% | 1,7% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des conférences ou cours agréés | Aucune efficacité | ,4% | ,0% | ,2% | ,0% | ,1% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% | ,0% |
| | Faible | ,6% | ,0% | 1,5% | ,5% | ,9% | ,9% | ,7% | 1,0% | ,1% | 1,0% | 6,6% | ,9% |
| | Passable | 2,6% | 1,6% | 4,6% | 2,3% | 2,5% | 3,6% | 4,2% | 3,3% | 4,4% | 3,9% | 2,5% | 3,4% |
| | Bonne | 17,2% | 19,9% | 20,8% | 16,7% | 16,7% | 15,8% | 24,1% | 13,6% | 18,6% | 19,0% | 14,4% | 17,3% |
| | Très bonne | 39,7% | 47,5% | 42,3% | 45,8% | 43,1% | 42,4% | 43,7% | 42,8% | 45,2% | 40,7% | 59,1% | 42,7% |
| | Excellente | 29,4% | 24,2% | 26,0% | 28,8% | 29,7% | 30,0% | 20,5% | 31,5% | 26,4% | 27,6% | 14,9% | 28,7% |
| | N'utilise pas | 1,0% | ,0% | ,2% | ,2% | ,5% | ,9% | 1,4% | 1,1% | ,2% | ,6% | ,0% | ,7% |
| | NR | 9,1% | 6,8% | 4,4% | 5,7% | 6,5% | 6,4% | 5,4% | 6,8% | 5,0% | 7,2% | 2,6% | 6,3% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

| <i>Dîners ou déjeuners non agréés, parrainés par les entreprises pharmaceutiques.</i> | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité de dîners ou déjeuners non agréés, parrainés par les entreprises pharmaceutiques | Aucune disponibilité | 3,9% | 1,6% | 4,3% | ,9% | 3,9% | 1,6% | 4,1% | 3,0% | 1,5% | 1,9% | 25,3% | 2,5% |
| | Faible | 8,8% | 3,2% | 7,1% | 12,0% | 7,1% | 4,2% | 6,3% | 6,9% | 5,1% | 4,8% | 24,7% | 5,6% |
| | Passable | 12,2% | 16,6% | 10,3% | 8,8% | 10,4% | 8,4% | 9,7% | 11,0% | 9,4% | 10,2% | 11,2% | 9,6% |
| | Bonne | 26,9% | 30,1% | 19,6% | 26,1% | 20,1% | 17,8% | 18,2% | 20,3% | 20,4% | 20,3% | ,0% | 19,5% |
| | Très bonne | 18,1% | 21,0% | 22,6% | 20,8% | 26,6% | 24,3% | 21,8% | 24,2% | 25,1% | 23,0% | ,0% | 24,4% |
| | Excellente | 17,8% | 8,8% | 19,8% | 23,0% | 19,5% | 29,3% | 23,4% | 21,1% | 24,5% | 23,5% | ,0% | 24,3% |
| | N'utilise pas | 8,5% | 15,1% | 12,8% | 5,2% | 9,3% | 11,6% | 12,8% | 10,6% | 11,5% | 12,9% | 32,2% | 11,1% |
| | NR | 3,9% | 3,6% | 3,5% | 3,2% | 3,1% | 2,8% | 3,8% | 2,8% | 2,6% | 3,4% | 6,6% | 3,0% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des dîners ou déjeuners non agréés, parrainés par les entreprises pharmaceutiques | Aucune efficacité | 3,0% | ,0% | 4,7% | 2,3% | 2,9% | 1,6% | 3,4% | 2,4% | 1,8% | 2,1% | 18,4% | 2,3% |
| | Faible | 5,4% | 10,7% | 9,1% | 7,5% | 6,8% | 7,6% | 8,1% | 6,8% | 8,9% | 8,2% | 21,9% | 7,7% |
| | Passable | 15,0% | 19,9% | 20,1% | 16,8% | 13,1% | 15,2% | 19,1% | 16,7% | 16,7% | 17,7% | 6,1% | 15,6% |
| | Bonne | 29,9% | 34,4% | 26,7% | 33,8% | 29,0% | 26,4% | 25,9% | 23,6% | 30,5% | 28,1% | 5,0% | 27,8% |
| | Très bonne | 21,9% | 9,9% | 15,8% | 20,8% | 21,9% | 20,3% | 16,6% | 16,8% | 19,8% | 16,9% | 2,0% | 19,7% |
| | Excellente | 7,1% | 3,6% | 2,7% | 6,6% | 8,5% | 8,8% | 5,3% | 13,0% | 4,8% | 5,7% | ,0% | 7,5% |
| | N'utilise pas | 7,2% | 14,7% | 13,4% | 5,4% | 9,2% | 12,3% | 12,8% | 12,8% | 10,2% | 12,9% | 27,3% | 11,3% |
| | NR | 10,4% | 6,8% | 7,4% | 6,9% | 8,7% | 7,8% | 8,7% | 7,9% | 7,3% | 8,4% | 19,2% | 8,1% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle
continue :

| <i>Journaux avec comités d'examen par les pairs</i> | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité de journaux avec comités d'examen par les pairs | Aucune disponibilité | 1,9% | 1,6% | ,8% | 2,0% | 4,4% | ,4% | ,7% | ,2% | ,4% | ,5% | ,0% | 1,5% |
| | Faible | 3,1% | 2,8% | 1,3% | 2,4% | 4,5% | ,7% | 2,1% | 1,6% | ,6% | 1,0% | 4,3% | 1,8% |
| | Passable | 2,0% | 2,8% | 3,0% | 5,4% | 5,2% | 3,2% | 4,6% | 6,1% | 3,9% | 3,5% | 2,6% | 4,0% |
| | Bonne | 18,5% | 11,4% | 12,1% | 13,8% | 15,5% | 10,8% | 13,7% | 11,7% | 10,8% | 13,1% | 25,4% | 12,7% |
| | Très bonne | 25,9% | 39,1% | 32,9% | 27,3% | 25,6% | 27,0% | 25,9% | 31,7% | 30,2% | 29,9% | 35,4% | 27,7% |
| | Excellente | 40,7% | 34,7% | 45,0% | 41,5% | 28,9% | 52,8% | 46,9% | 43,8% | 50,0% | 47,3% | 29,8% | 44,5% |
| | N'utilise pas | 4,6% | ,0% | 1,9% | 4,8% | 11,1% | 2,6% | 1,9% | 2,5% | 2,3% | 2,0% | 2,6% | 4,6% |
| | NR | 3,3% | 7,5% | 3,0% | 2,9% | 4,9% | 2,6% | 4,2% | 2,3% | 1,8% | 2,7% | ,0% | 3,2% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des journaux avec comités d'examen par les pairs | Aucune efficacité | ,9% | 1,6% | ,5% | ,0% | 1,5% | ,1% | ,7% | ,0% | ,1% | ,3% | ,0% | ,5% |
| | Faible | ,9% | ,0% | 1,4% | 2,8% | 2,0% | 1,4% | 3,1% | 2,3% | 2,0% | 1,2% | ,0% | 1,7% |
| | Passable | 5,0% | 6,8% | 4,1% | 5,2% | 5,3% | 5,9% | 5,5% | 8,8% | 7,2% | 7,0% | 9,4% | 6,0% |
| | Bonne | 24,9% | 22,7% | 22,2% | 24,0% | 21,1% | 22,5% | 21,7% | 23,0% | 24,0% | 23,1% | 48,6% | 22,5% |
| | Très bonne | 33,8% | 42,8% | 39,7% | 38,9% | 29,4% | 35,0% | 39,0% | 36,3% | 38,2% | 36,6% | 31,8% | 34,6% |
| | Excellente | 20,4% | 17,4% | 23,3% | 16,5% | 19,0% | 25,7% | 21,2% | 19,5% | 21,5% | 22,2% | 5,0% | 22,4% |
| | N'utilise pas | 3,8% | ,0% | 2,8% | 5,5% | 11,1% | 2,0% | 1,5% | 1,9% | 2,2% | 1,4% | ,0% | 4,3% |
| | NR | 10,3% | 8,8% | 6,1% | 7,1% | 10,7% | 7,3% | 7,3% | 8,3% | 4,9% | 8,1% | 5,2% | 8,0% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle
continue :

| <i>Publications médicales sans comités d'examen par les pairs</i> | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité de publications médicales sans comités d'examen par les pairs | Aucune disponibilité | 2,3% | 6,0% | 2,8% | 2,8% | 2,6% | 1,4% | 1,5% | 2,2% | 1,7% | ,5% | ,0% | 1,7% |
| | Faible | 2,7% | 3,6% | 1,9% | 2,2% | 3,7% | 2,4% | 4,8% | 6,9% | 2,9% | 3,7% | 2,5% | 3,1% |
| | Passable | 11,7% | 1,2% | 7,1% | 6,2% | 6,8% | 6,0% | 6,7% | 6,5% | 6,4% | 7,0% | ,0% | 6,5% |
| | Bonne | 17,9% | 20,9% | 14,0% | 20,8% | 20,7% | 15,0% | 14,7% | 17,9% | 18,1% | 16,6% | 31,5% | 17,3% |
| | Très bonne | 16,8% | 21,3% | 20,2% | 19,3% | 23,4% | 20,7% | 17,4% | 21,1% | 20,2% | 18,5% | 15,3% | 20,8% |
| | Excellente | 24,6% | 35,4% | 30,1% | 27,7% | 26,7% | 33,3% | 31,4% | 24,0% | 29,8% | 30,5% | 30,2% | 30,2% |
| | N'utilise pas | 16,9% | 9,9% | 17,7% | 17,4% | 10,3% | 17,0% | 18,5% | 16,8% | 17,3% | 17,5% | 20,6% | 15,5% |
| | NR | 7,1% | 1,6% | 5,9% | 3,7% | 5,8% | 4,2% | 5,0% | 4,6% | 3,6% | 5,7% | ,0% | 4,9% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des publications médicales sans comités d'examen par les pairs | Aucune efficacité | 1,9% | 3,2% | 3,4% | 1,6% | 2,5% | 1,9% | 3,1% | 1,8% | 3,5% | 1,7% | ,0% | 2,3% |
| | Faible | 8,6% | 17,2% | 11,5% | 7,4% | 7,2% | 9,3% | 13,2% | 10,7% | 12,7% | 10,8% | 22,8% | 9,6% |
| | Passable | 23,8% | 20,6% | 22,5% | 21,7% | 17,8% | 19,5% | 20,8% | 18,9% | 18,4% | 24,5% | 18,9% | 20,0% |
| | Bonne | 19,4% | 23,7% | 20,9% | 26,1% | 26,5% | 25,2% | 21,7% | 23,7% | 26,2% | 23,2% | 25,8% | 24,9% |
| | Très bonne | 10,7% | 11,9% | 11,0% | 11,3% | 16,9% | 13,0% | 9,2% | 11,3% | 9,6% | 8,7% | 9,3% | 12,7% |
| | Excellente | 4,8% | ,0% | 2,5% | 4,9% | 7,7% | 4,4% | 4,4% | 4,9% | 2,6% | 2,6% | ,0% | 4,7% |
| | N'utilise pas | 15,9% | 14,7% | 17,8% | 17,3% | 10,3% | 16,0% | 15,3% | 17,4% | 18,1% | 16,0% | 18,0% | 14,9% |
| | NR | 14,7% | 8,8% | 10,4% | 9,6% | 11,0% | 10,8% | 12,4% | 11,3% | 8,9% | 12,6% | 5,2% | 11,0% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

| Ressources fondées sur des données probantes (p. ex. lignes directrices, guides de pratique clinique, banques de données) | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité de ressources fondées sur des données probantes (p. ex. lignes directrices, guides de pratique clinique, banques de données) | Aucune disponibilité | ,5% | ,0% | 1,6% | ,0% | ,6% | ,3% | ,2% | ,6% | ,4% | ,3% | ,0% | ,4% |
| | Faible | 1,6% | ,0% | 2,6% | 4,8% | 1,4% | 2,4% | 2,0% | 3,4% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 2,0% |
| | Passable | 8,4% | 7,7% | 7,4% | 8,5% | 6,1% | 7,5% | 9,4% | 8,8% | 6,9% | 6,9% | 2,6% | 7,1% |
| | Bonne | 20,8% | 19,7% | 21,1% | 26,6% | 20,5% | 23,0% | 26,1% | 19,4% | 24,2% | 24,5% | 26,9% | 22,7% |
| | Très bonne | 34,5% | 48,8% | 34,7% | 30,8% | 34,8% | 31,3% | 30,5% | 37,0% | 36,6% | 33,5% | 42,8% | 33,4% |
| | Excellente | 29,6% | 14,7% | 24,2% | 23,4% | 29,6% | 28,4% | 25,5% | 24,3% | 26,3% | 25,6% | 26,2% | 27,6% |
| | N'utilise pas | 1,5% | 4,0% | 3,3% | 1,9% | 3,0% | 4,0% | 2,6% | 3,3% | 1,7% | 3,8% | ,0% | 3,3% |
| | NR | 3,0% | 5,1% | 5,2% | 4,0% | 4,0% | 3,2% | 3,8% | 3,2% | 2,3% | 3,8% | ,0% | 3,5% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des ressources fondées sur des données probantes | Aucune efficacité | ,5% | ,0% | 1,2% | ,7% | ,3% | ,3% | ,8% | ,0% | ,4% | ,4% | ,0% | ,4% |
| | Faible | 2,6% | 1,2% | 2,7% | 3,4% | ,4% | 2,4% | 2,8% | 2,1% | 2,0% | 2,7% | 2,6% | 1,9% |
| | Passable | 3,6% | 6,7% | 6,9% | 8,2% | 5,3% | 7,2% | 7,4% | 6,6% | 9,1% | 10,6% | 1,6% | 7,3% |
| | Bonne | 20,9% | 19,4% | 21,9% | 20,1% | 15,6% | 21,9% | 26,1% | 22,3% | 22,3% | 24,1% | 30,3% | 20,8% |
| | Très bonne | 35,0% | 44,4% | 34,4% | 31,7% | 33,4% | 32,2% | 32,1% | 32,5% | 36,4% | 34,1% | 46,8% | 33,4% |
| | Excellente | 27,7% | 19,5% | 21,1% | 26,1% | 33,1% | 24,1% | 20,1% | 23,8% | 22,5% | 15,6% | 16,1% | 24,7% |
| | N'utilise pas | 1,0% | 2,0% | 3,2% | 1,9% | 3,4% | 3,9% | 2,8% | 4,0% | 1,5% | 3,9% | ,0% | 3,4% |
| | NR | 8,7% | 6,8% | 8,6% | 7,9% | 8,5% | 8,0% | 7,8% | 8,6% | 5,8% | 8,6% | 2,6% | 8,0% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

| <i>Cours de formation en ligne</i> | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité de cours de formation en ligne | Aucune disponibilité | 1,4% | 1,6% | 2,5% | 2,6% | 5,9% | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 1,0% | 1,8% | 5,1% | 2,6% |
| | Faible | 2,6% | 1,2% | 3,9% | 4,2% | 9,1% | 3,7% | 4,6% | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 5,0% |
| | Passable | 9,5% | 8,3% | 8,9% | 11,9% | 11,8% | 8,7% | 8,0% | 7,7% | 8,1% | 9,5% | ,0% | 9,5% |
| | Bonne | 18,9% | 16,6% | 18,3% | 16,6% | 19,1% | 18,0% | 18,6% | 17,7% | 20,4% | 18,4% | 24,8% | 18,6% |
| | Très bonne | 20,8% | 22,7% | 19,4% | 18,0% | 12,3% | 18,6% | 17,4% | 22,1% | 22,6% | 18,4% | 23,1% | 17,6% |
| | Excellente | 20,5% | 21,4% | 14,2% | 17,3% | 8,4% | 16,5% | 17,0% | 18,5% | 15,2% | 15,5% | 9,0% | 14,3% |
| | N'utilise pas | 22,6% | 24,6% | 28,9% | 25,1% | 28,0% | 28,7% | 28,4% | 25,3% | 25,9% | 27,4% | 32,6% | 27,8% |
| | NR | 3,8% | 3,6% | 3,9% | 4,3% | 5,4% | 4,4% | 4,9% | 3,3% | 3,1% | 5,4% | 2,0% | 4,6% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des cours de formation en ligne | Aucune efficacité | ,6% | 1,6% | 2,7% | 2,8% | 3,7% | ,9% | 2,3% | 2,0% | 1,3% | 2,5% | ,0% | 2,0% |
| | Faible | 6,0% | 5,1% | 5,5% | 7,6% | 5,9% | 4,1% | 3,7% | 3,0% | 4,9% | 4,5% | 11,3% | 4,8% |
| | Passable | 6,2% | 11,3% | 9,3% | 8,9% | 9,9% | 9,0% | 7,8% | 8,0% | 7,9% | 8,0% | 13,3% | 8,9% |
| | Bonne | 22,2% | 17,0% | 19,2% | 20,4% | 17,3% | 19,7% | 19,9% | 18,3% | 20,4% | 18,3% | 27,3% | 19,0% |
| | Très bonne | 20,4% | 17,1% | 13,1% | 15,9% | 14,3% | 14,5% | 14,7% | 17,7% | 18,3% | 16,2% | 7,5% | 15,3% |
| | Excellente | 10,0% | 8,3% | 6,6% | 5,2% | 5,5% | 7,8% | 6,9% | 12,9% | 7,5% | 5,1% | ,9% | 6,8% |
| | N'utilise pas | 21,4% | 34,9% | 32,8% | 28,6% | 31,1% | 32,1% | 32,5% | 28,1% | 30,6% | 33,7% | 22,3% | 31,6% |
| | NR | 13,2% | 4,8% | 10,9% | 10,6% | 12,2% | 12,0% | 12,2% | 10,0% | 9,1% | 11,7% | 17,4% | 11,6% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

| <i>Visites, clubs de lecture, activités en petit groupe</i> | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité de visites, clubs de lecture, activités en petit groupe | Aucune disponibilité | 5,9% | 1,6% | 3,7% | 4,4% | 5,0% | 1,7% | 5,0% | 4,9% | 3,3% | 2,7% | ,9% | 3,2% |
| | Faible | 7,5% | 2,0% | 8,6% | 9,6% | 9,0% | 5,1% | 5,3% | 8,2% | 4,1% | 5,1% | 10,0% | 6,3% |
| | Passable | 8,1% | 13,2% | 10,0% | 12,6% | 12,7% | 9,5% | 9,0% | 9,6% | 11,7% | 12,3% | 10,9% | 11,0% |
| | Bonne | 19,6% | 29,4% | 13,3% | 16,7% | 20,1% | 16,3% | 13,9% | 19,8% | 18,7% | 19,2% | 30,8% | 18,0% |
| | Très bonne | 21,8% | 26,1% | 22,7% | 22,7% | 19,3% | 22,7% | 25,1% | 24,7% | 25,0% | 24,1% | 29,3% | 22,4% |
| | Excellente | 27,2% | 22,6% | 30,2% | 21,7% | 15,2% | 30,2% | 27,8% | 22,9% | 25,4% | 21,1% | 13,0% | 24,1% |
| | N'utilise pas | 7,9% | 3,6% | 7,7% | 7,6% | 13,2% | 10,7% | 9,4% | 6,8% | 9,2% | 11,3% | 2,6% | 10,8% |
| | NR | 2,0% | 1,6% | 3,8% | 4,7% | 5,5% | 3,7% | 4,5% | 3,1% | 2,6% | 4,1% | 2,6% | 4,1% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des visites, clubs de lecture, activités en petit groupe | Aucune efficacité | 3,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 2,2% | ,7% | 2,5% | 2,1% | 1,1% | 1,5% | ,0% | 1,4% |
| | Faible | 2,8% | 1,6% | 2,2% | 3,9% | 2,5% | 2,1% | 2,5% | 2,7% | 1,8% | 1,8% | 5,0% | 2,2% |
| | Passable | 6,8% | 4,5% | 4,4% | 6,6% | 5,4% | 5,3% | 4,6% | 7,7% | 8,1% | 5,9% | 2,6% | 5,8% |
| | Bonne | 16,5% | 24,9% | 17,4% | 13,1% | 19,3% | 17,1% | 19,6% | 18,8% | 21,3% | 17,8% | 36,2% | 18,3% |
| | Très bonne | 32,1% | 33,3% | 31,1% | 29,7% | 27,7% | 28,6% | 28,4% | 29,2% | 30,6% | 28,2% | 34,4% | 28,7% |
| | Excellente | 20,5% | 24,2% | 26,2% | 24,4% | 16,4% | 24,6% | 23,2% | 20,3% | 18,0% | 21,4% | 13,9% | 21,2% |
| | N'utilise pas | 8,5% | 5,1% | 8,1% | 11,6% | 14,5% | 12,1% | 10,8% | 10,0% | 11,5% | 13,4% | ,0% | 12,4% |
| | NR | 9,4% | 4,8% | 9,0% | 9,0% | 12,0% | 9,4% | 8,4% | 9,2% | 7,7% | 10,1% | 7,7% | 9,9% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

| <i>Programmes d'auto-évaluation (p. ex. Questions à choix multiples (QCM), portfolio des services offerts dans la pratique, registres d'EMC, rétroaction de sources multiples)</i> | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Disponibilité de programmes d'auto-évaluation (p. ex. Questions à choix multiples (QCM), portfolio des services offerts dans la pratique, registres d'EMC, rétroaction de sources multiples) | Aucune disponibilité | 2,9% | 3,2% | 4,0% | 2,3% | 5,2% | 2,1% | 2,5% | 2,3% | 1,4% | 3,3% | 11,8% | 3,1% |
| | Faible | 7,2% | 9,5% | 8,1% | 7,9% | 10,0% | 4,9% | 6,2% | 5,1% | 5,4% | 4,9% | 2,6% | 6,5% |
| | Passable | 12,0% | 8,0% | 10,8% | 13,3% | 13,2% | 10,8% | 10,6% | 11,2% | 13,2% | 11,5% | 14,6% | 11,8% |
| | Bonne | 21,0% | 12,7% | 21,6% | 17,7% | 19,3% | 18,6% | 20,0% | 20,7% | 21,9% | 19,0% | 23,3% | 19,4% |
| | Très bonne | 18,7% | 23,5% | 16,8% | 16,5% | 12,8% | 16,5% | 16,9% | 23,6% | 18,3% | 16,9% | 19,4% | 16,1% |
| | Excellente | 15,8% | 10,3% | 9,0% | 13,2% | 8,3% | 14,6% | 11,7% | 15,0% | 10,5% | 9,0% | 2,0% | 11,5% |
| | N'utilise pas | 18,6% | 25,3% | 24,3% | 24,9% | 26,2% | 28,2% | 26,1% | 18,4% | 25,5% | 30,8% | 26,2% | 27,1% |
| | NR | 3,8% | 7,5% | 5,4% | 4,2% | 5,0% | 4,2% | 6,1% | 3,7% | 3,7% | 4,5% | ,0% | 4,5% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Efficacité des programmes d'auto-évaluation (p. ex. Questions à choix multiples (QCM), portfolio des services offerts dans la pratique, registres d'EMC, rétroaction de sources multiples) | Aucune efficacité | 1,0% | 1,6% | 3,5% | 2,6% | 3,0% | 1,4% | 2,2% | ,9% | 1,8% | 2,4% | 9,2% | 2,1% |
| | Faible | 6,6% | 3,6% | 6,3% | 5,0% | 6,5% | 5,0% | 6,1% | 4,3% | 4,8% | 6,6% | 6,7% | 5,7% |
| | Passable | 9,3% | 9,5% | 9,2% | 11,0% | 9,7% | 9,9% | 8,6% | 8,9% | 12,8% | 8,3% | 11,8% | 9,8% |
| | Bonne | 19,1% | 8,4% | 19,9% | 17,2% | 18,4% | 17,8% | 18,1% | 22,0% | 17,9% | 18,4% | 29,3% | 18,2% |
| | Très bonne | 20,8% | 21,0% | 14,4% | 15,1% | 16,2% | 14,0% | 13,8% | 19,5% | 17,4% | 14,0% | 6,3% | 15,2% |
| | Excellente | 12,5% | 10,8% | 5,6% | 6,4% | 6,6% | 8,9% | 8,7% | 11,7% | 6,3% | 4,1% | 2,9% | 7,3% |
| | N'utilise pas | 18,4% | 36,8% | 31,3% | 29,4% | 27,4% | 31,7% | 30,3% | 22,4% | 29,9% | 33,5% | 16,4% | 30,1% |
| | NR | 12,3% | 8,4% | 9,8% | 13,3% | 12,2% | 11,3% | 12,1% | 10,4% | 9,3% | 12,8% | 17,4% | 11,5% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

| Évaluations de la qualité de l'exercice professionnel («audit de pratique») | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité des évaluations de la qualité de l'exercice professionnel («audit de pratique») | Aucune disponibilité | 10,3% | 4,7% | 7,2% | 6,5% | 8,3% | 4,3% | 8,5% | 4,6% | 5,0% | 4,8% | 24,1% | 5,9% |
| | Faible | 8,3% | 9,1% | 10,8% | 11,9% | 13,2% | 9,0% | 11,8% | 8,8% | 10,4% | 9,4% | 4,5% | 10,4% |
| | Passable | 15,7% | 9,9% | 12,8% | 15,7% | 12,4% | 11,9% | 11,7% | 14,9% | 14,6% | 13,3% | 20,7% | 12,8% |
| | Bonne | 17,7% | 15,1% | 18,1% | 17,8% | 15,5% | 14,7% | 14,2% | 23,2% | 18,6% | 16,3% | 6,7% | 15,9% |
| | Très bonne | 8,8% | 15,9% | 11,0% | 7,7% | 8,3% | 6,4% | 7,8% | 13,9% | 12,5% | 7,2% | ,0% | 8,1% |
| | Excellente | 7,9% | 2,0% | 5,3% | 3,2% | 3,7% | 6,2% | 4,7% | 6,6% | 6,4% | 4,6% | 2,0% | 5,2% |
| | N'utilise pas | 26,2% | 39,8% | 30,5% | 33,1% | 32,8% | 43,3% | 36,4% | 25,2% | 29,7% | 40,4% | 39,4% | 37,2% |
| | NR | 5,1% | 3,6% | 4,4% | 4,1% | 5,8% | 4,3% | 4,8% | 2,8% | 2,8% | 3,9% | 2,6% | 4,4% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des évaluations de la qualité de l'exercice professionnel («audit de pratique») | Aucune efficacité | 4,8% | 1,6% | 5,2% | 5,5% | 4,1% | 3,2% | 5,0% | 3,0% | 5,0% | 3,9% | 19,0% | 4,0% |
| | Faible | 7,9% | 6,4% | 8,2% | 6,4% | 7,5% | 6,9% | 7,9% | 6,4% | 10,7% | 7,5% | ,0% | 7,6% |
| | Passable | 9,6% | 4,7% | 9,2% | 10,4% | 8,3% | 8,5% | 9,2% | 13,5% | 10,5% | 7,5% | 6,6% | 8,7% |
| | Bonne | 16,8% | 15,1% | 17,8% | 16,4% | 15,8% | 11,6% | 11,1% | 18,6% | 15,8% | 12,7% | 9,3% | 13,8% |
| | Très bonne | 11,8% | 17,4% | 10,3% | 9,2% | 11,8% | 8,9% | 8,0% | 13,7% | 11,1% | 9,5% | 11,5% | 10,2% |
| | Excellente | 8,6% | 2,8% | 5,0% | 3,5% | 5,6% | 5,2% | 4,4% | 7,3% | 6,1% | 3,1% | 6,5% | 5,1% |
| | N'utilise pas | 24,9% | 42,9% | 33,3% | 36,9% | 33,6% | 43,4% | 41,2% | 27,2% | 32,1% | 42,5% | 25,4% | 38,3% |
| | NR | 15,7% | 9,1% | 11,0% | 11,7% | 13,3% | 12,4% | 13,2% | 10,3% | 8,9% | 13,2% | 21,7% | 12,3% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

| Méthodes d'auto-apprentissage (p. ex. auto-apprentissage, apprentissage en petit groupe fondé sur la pratique) | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité de méthodes d'auto-apprentissage (p. ex. auto-apprentissage, apprentissage en petit groupe fondé sur la pratique) | Aucune disponibilité | 4,9% | 1,6% | 3,3% | 1,9% | 5,4% | 1,5% | ,8% | 1,7% | 1,1% | 1,8% | 9,3% | 2,6% |
| | Faible | 4,9% | 4,4% | 4,2% | 5,6% | 7,0% | 3,0% | 5,4% | 3,0% | 3,3% | 4,2% | ,0% | 4,4% |
| | Passable | 6,9% | 8,3% | 8,5% | 11,7% | 11,3% | 7,2% | 5,7% | 6,5% | 9,3% | 10,2% | 2,6% | 8,9% |
| | Bonne | 15,5% | 10,7% | 15,1% | 18,9% | 19,6% | 15,6% | 19,8% | 23,0% | 16,0% | 19,1% | 33,3% | 17,6% |
| | Très bonne | 25,3% | 21,5% | 26,1% | 20,0% | 16,8% | 23,2% | 24,6% | 24,6% | 28,6% | 22,5% | 34,6% | 22,2% |
| | Excellente | 26,9% | 35,7% | 28,7% | 25,7% | 13,4% | 33,7% | 29,9% | 29,1% | 28,7% | 25,0% | 15,5% | 26,2% |
| | N'utilise pas | 12,6% | 11,9% | 10,9% | 12,1% | 21,3% | 12,5% | 10,3% | 9,4% | 11,2% | 14,5% | 4,8% | 14,6% |
| | NR | 3,1% | 6,0% | 3,1% | 4,1% | 5,1% | 3,4% | 3,6% | 2,6% | 1,8% | 2,7% | ,0% | 3,5% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des méthodes d'auto-apprentissage (p. ex. auto-apprentissage, apprentissage en petit groupe fondé sur la pratique) | Aucune efficacité | 1,6% | ,0% | 2,4% | 1,6% | 2,6% | ,7% | 1,2% | 1,1% | ,7% | 1,6% | 6,6% | 1,4% |
| | Faible | 1,7% | ,0% | 1,7% | 3,1% | 3,2% | 1,8% | 2,4% | ,5% | 2,0% | 2,1% | ,0% | 2,2% |
| | Passable | 4,4% | 4,7% | 4,6% | 4,7% | 5,3% | 4,6% | 5,0% | 5,4% | 5,8% | 5,7% | ,0% | 5,1% |
| | Bonne | 15,9% | 9,5% | 17,7% | 15,1% | 17,6% | 13,3% | 17,1% | 20,7% | 17,8% | 15,6% | 34,6% | 15,8% |
| | Très bonne | 28,3% | 34,5% | 26,3% | 30,8% | 22,9% | 27,6% | 28,6% | 27,6% | 29,9% | 28,1% | 29,2% | 26,9% |
| | Excellente | 23,0% | 33,0% | 28,4% | 21,9% | 14,8% | 29,8% | 25,7% | 25,9% | 25,7% | 23,1% | 19,5% | 24,1% |
| | N'utilise pas | 13,2% | 9,9% | 10,9% | 12,4% | 22,2% | 12,6% | 11,2% | 10,5% | 10,7% | 13,6% | 4,8% | 14,7% |
| | NR | 12,0% | 8,4% | 8,0% | 10,3% | 11,5% | 9,4% | 8,8% | 8,3% | 7,4% | 10,3% | 5,2% | 9,8% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

| Simulateurs | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | TN/LB n=193 N=974 | IPE n=59 N=206 | NE n=521 N=1967 | NB n=310 N=1300 | QC n=1551 N=14235 | ON n=2375 N=21031 | MB n=450 N=2059 | SK n=328 N=1505 | AB n=659 N=5943 | CB n=869 N=8420 | TNO/YT/ NU n=32 N=114 | Total n=7347 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Disponibilité de simulateurs | Aucune disponibilité | 19,6% | 13,2% | 14,9% | 18,2% | 16,6% | 12,3% | 16,2% | 16,1% | 12,1% | 13,7% | 23,1% | 14,1% |
| | Faible | 7,6% | 14,3% | 13,1% | 13,5% | 12,5% | 10,2% | 13,6% | 11,6% | 11,1% | 11,8% | 7,6% | 11,4% |
| | Passable | 7,7% | 7,1% | 8,4% | 4,1% | 7,9% | 5,7% | 7,7% | 10,7% | 11,7% | 7,6% | 5,0% | 7,4% |
| | Bonne | 6,4% | 3,6% | 5,6% | 4,9% | 6,9% | 5,5% | 4,6% | 6,2% | 7,2% | 5,0% | ,0% | 5,9% |
| | Très bonne | 3,1% | ,0% | 3,7% | 1,3% | 3,5% | 3,0% | 2,8% | 3,0% | 3,4% | 2,8% | ,0% | 3,1% |
| | Excellente | 3,5% | ,0% | 3,2% | ,5% | 1,2% | 2,0% | 2,4% | 1,6% | 3,2% | 1,9% | ,0% | 1,9% |
| | N'utilise pas | 43,8% | 57,2% | 44,2% | 48,7% | 43,7% | 52,7% | 44,8% | 44,6% | 46,6% | 49,9% | 61,6% | 48,4% |
| | NR | 8,4% | 4,7% | 6,8% | 8,7% | 7,7% | 8,7% | 7,8% | 6,1% | 4,6% | 7,3% | 2,6% | 7,6% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
| Efficacité des simulateurs | Aucune efficacité | 8,1% | 5,1% | 5,3% | 5,8% | 6,3% | 4,8% | 6,2% | 6,3% | 5,3% | 6,6% | 16,4% | 5,7% |
| | Faible | 1,7% | 3,2% | 2,8% | 4,4% | 3,6% | 3,2% | 5,0% | 5,2% | 2,9% | 3,5% | ,0% | 3,4% |
| | Passable | 7,1% | 2,0% | 4,0% | 3,4% | 3,5% | 3,6% | 3,5% | 6,0% | 5,3% | 3,8% | 2,5% | 3,9% |
| | Bonne | 5,1% | 3,6% | 8,2% | 5,3% | 8,9% | 5,7% | 5,5% | 6,5% | 6,8% | 4,5% | 7,6% | 6,5% |
| | Très bonne | 9,1% | 15,1% | 7,4% | 5,0% | 8,6% | 6,0% | 6,3% | 7,8% | 8,8% | 7,4% | ,0% | 7,3% |
| | Excellente | 5,7% | ,0% | 8,0% | 4,1% | 6,5% | 4,4% | 5,8% | 5,6% | 7,8% | 4,7% | 4,1% | 5,5% |
| | N'utilise pas | 44,2% | 57,6% | 49,1% | 57,1% | 46,5% | 54,9% | 50,5% | 49,2% | 49,3% | 52,0% | 52,0% | 51,2% |
| | NR | 19,0% | 13,5% | 15,2% | 14,8% | 16,0% | 17,5% | 17,2% | 13,4% | 13,7% | 17,5% | 17,4% | 16,5% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.