

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

**Q28d. Parmi les actes suivants, lesquels accomplissez-vous dans le cadre de votre pratique? Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.**

Question posée aux MF/omnipraticiens seulement	Province											Tous les MF/omnis
	TN/LB n=123 N=608	IPE n=34 N=130	NE n=276 N=1029	NB n=194 N=788	QC n=764 N=7003	ON n=1197 N=10133	MB n=229 N=1066	SK n=188 N=912	AB n=343 N=3068	CB n=470 N=4515	TNO/ YT/NU n=23 N=88	Total n=3841 N=29339
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Incision et drainage d'abcès	77,1%	71,1%	77,7%	70,7%	67,9%	77,1%	80,7%	81,5%	79,9%	85,8%	**	76,6%
Sutures et réparations de lacération	76,4%	71,7%	70,7%	68,3%	66,5%	66,9%	79,1%	79,8%	79,0%	84,3%	**	72,0%
Installation d'un plâtre pour une fracture	46,5%	42,8%	33,9%	43,3%	17,3%	26,5%	58,2%	52,4%	47,9%	44,5%	**	32,6%
Cryothérapie de lésions cutanées	61,1%	56,6%	65,4%	53,9%	55,0%	63,4%	65,5%	62,5%	65,1%	76,7%	**	63,5%
Excision de lésions cutanées	62,5%	60,4%	62,3%	63,1%	39,7%	52,1%	70,0%	71,3%	67,3%	74,7%	**	56,4%
Grattage cutané pour prélever un champignon	51,6%	61,0%	56,7%	54,2%	35,3%	57,3%	61,3%	56,9%	57,1%	65,5%	**	53,2%
Utilisation d'une lampe de Wood	20,0%	22,0%	14,2%	25,5%	46,0%	10,4%	24,9%	27,2%	12,6%	22,0%	**	22,8%
Drainage d'un hématome sous-unguéal	64,2%	79,2%	68,7%	68,8%	66,4%	69,1%	74,9%	62,2%	73,1%	76,7%	**	69,9%
Drainage d'un périonyxis aigu	62,0%	62,3%	65,1%	61,4%	42,9%	64,8%	73,9%	67,3%	65,9%	75,2%	**	61,6%
Exérèse d'une callosité cutanée	55,5%	59,1%	66,9%	58,0%	49,5%	60,6%	60,7%	57,7%	60,1%	68,4%	**	59,1%
Anesthésie locale par infiltration	78,2%	79,2%	81,2%	74,4%	66,6%	72,2%	82,1%	79,7%	79,9%	86,6%	**	75,0%
Exérèse d'un corps étranger de la cornée ou de la conjunctive	63,7%	62,9%	61,4%	57,4%	59,1%	54,5%	72,4%	67,9%	67,1%	73,8%	**	61,6%
Exérèse de cérumen ou lavage du canal auditif	75,6%	87,4%	81,6%	85,3%	79,0%	86,4%	83,8%	78,0%	83,0%	86,6%	**	83,6%
Cautérisation du nez suite à un épistaxis antérieur	48,2%	58,5%	47,5%	53,6%	51,5%	52,8%	61,7%	57,8%	61,6%	66,3%	**	55,8%
Retirer un corps étranger	66,5%	67,9%	71,7%	65,7%	60,6%	69,4%	75,5%	73,5%	75,4%	78,4%	**	69,6%
Insertion d'une sonde nasogastrique	50,0%	37,1%	36,8%	49,2%	27,2%	26,8%	46,9%	42,1%	35,6%	37,0%	**	32,2%
Recherche de sang occulte dans les selles	65,0%	73,6%	61,3%	59,6%	43,4%	64,9%	74,1%	59,2%	54,3%	68,9%	**	59,2%
Insertion d'un cathéter transurétral	50,7%	30,8%	42,0%	38,7%	22,8%	28,4%	48,1%	49,0%	37,6%	38,8%	**	32,3%
Cryothérapie ou chimiothérapie des condylomes	52,0%	45,3%	61,8%	53,8%	49,6%	56,9%	61,0%	57,0%	63,3%	72,4%	**	58,4%
Test de Papanicolaou	66,3%	74,8%	76,5%	79,2%	72,3%	76,8%	77,2%	70,9%	75,0%	78,9%	**	75,5%
Forceps bas	5,3%	,0%	3,6%	5,0%	2,6%	3,7%	9,5%	13,9%	9,3%	9,7%	**	5,5%
Forceps moyen et rotation	,0%	,0%	,9%	,0%	,5%	,4%	1,0%	1,2%	2,0%	1,4%	**	,8%
Ventouse obstétricale	10,6%	,0%	7,7%	11,1%	5,8%	7,3%	14,7%	19,4%	15,7%	20,5%	**	10,8%
Pose d'une attelle sur un membre fracturé	51,2%	43,4%	45,6%	46,4%	37,3%	46,7%	62,6%	61,9%	56,0%	61,0%	**	48,8%
Ventilation avec masque et ballon	54,1%	42,2%	39,9%	44,8%	36,6%	30,1%	46,6%	48,0%	39,8%	44,8%	**	37,5%
Ponction veineuse	64,1%	68,6%	48,8%	40,5%	25,8%	48,5%	58,0%	54,0%	40,0%	37,9%	**	41,3%
Injection sous-cutanée	78,7%	76,1%	82,0%	77,2%	76,3%	85,7%	81,9%	75,8%	80,8%	85,6%	**	82,0%
Injection intramusculaire	80,4%	81,7%	83,5%	81,5%	77,0%	87,3%	83,9%	77,4%	84,4%	88,5%	**	83,8%
Insertion d'un cathéter intraveineux périphérique chez un adulte et un enfant	45,7%	40,3%	38,5%	34,5%	17,2%	22,2%	45,0%	46,0%	34,0%	33,8%	**	27,2%
Insertion d'un cathéter central chez un adulte	20,3%	18,9%	11,4%	16,2%	13,6%	14,7%	23,7%	20,9%	21,7%	16,9%	**	16,2%

(suite)

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

**Q28d. Parmi les actes suivants, lesquels accomplissez-vous dans le cadre de votre pratique? Veuillez cocher toutes les cases pertinentes. (suite)**

Question posée aux MF/omnipraticiens seulement	Province											Tous les MF/omnis
	TN/LB n=123 N=608	IPE n=34 N=130	NE n=276 N=1029	NB n=194 N=788	QC n=764 N=7003	ON n=1197 N=10133	MB n=229 N=1066	SK n=188 N=912	AB n=343 N=3068	CB n=470 N=4515	TNO/ YT/NU n=23 N=88	Total n=3841 N=29339
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Préparation pour transport terrestre ou aérien	32,5%	18,9%	18,7%	18,3%	14,9%	15,2%	22,9%	18,7%	23,6%	21,0%	**	18,0%
Acupuncture	3,8%	,0%	3,4%	2,6%	1,1%	2,1%	3,6%	2,9%	4,8%	5,0%	**	2,8%
Hypnose	,8%	6,3%	3,6%	2,8%	1,5%	1,7%	1,2%	2,2%	1,4%	2,2%	**	1,8%
Aucune des réponses ci-dessus	2,3%	,0%	2,4%	3,9%	3,9%	3,7%	3,2%	3,2%	3,5%	3,1%	**	3,5%
NR	5,1%	3,1%	5,9%	3,2%	2,4%	3,0%	2,0%	5,7%	4,2%	3,1%	**	3,2%

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux médecins de famille/omnipraticiens répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca). \*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.