

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes en chirurgie.

**Q20. Veuillez indiquer avec qui vous ne collaborez pas. Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.**

Question posée aux autres spécialistes seulement		Spécialistes en chirurgie									Total n=776 N=6318
		ChirCVT n=25 N=203	ChirGén n=166 N=1423	NeuroChir n=24 N=179	ObGyn n=184 N=1433	Ophtalmo n=112 N=905	ChirOrtho n=116 N=963	ORL n=57 N=447	ChirPlast n=37 N=313	Urologue n=55 N=453	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Ne collabore pas avec d'autres spécialistes (réponse des autres spécialistes)	Oui	**	1,3%	**	3,9%	,9%	2,0%	6,0%	5,7%	1,0%	2,4%
	Non	**	98,7%	**	95,3%	98,3%	97,7%	92,1%	94,3%	99,0%	97,1%
	NR	**	,0%	**	,8%	,7%	,4%	2,0%	,0%	,0%	,5%
	Total	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux autres spécialistes répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes en chirurgie.

**Q20. Veuillez indiquer avec qui vous ne collaborez pas. Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.**

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes	Spécialistes en chirurgie									
	ChirCVT n=25 N=203	ChirGén n=166 N=1423	Neuro Chir n=24 N=179	ObGyn n=184 N=1433	Ophtalmo n=112 N=905	Chir Ortho n=116 N=963	ORL n=57 N=447	Chir Plast n=37 N=313	Urologue n=55 N=453	Total n=776 N=6318
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ne collabore pas avec des médecins de famille	**	4,9%	**	5,1%	5,2%	2,9%	10,7%	2,7%	5,0%	5,6%
Ne collabore pas avec des infirmières praticiennes	**	34,2%	**	35,1%	42,4%	45,5%	43,0%	36,1%	52,3%	38,7%
Ne collabore pas avec des infirmières en psychiatrie	**	53,9%	**	54,4%	49,8%	50,5%	51,3%	49,8%	68,4%	53,6%
Ne collabore pas avec d'autres infirmières (p. ex.: inf. aut., inf. aux. aut.)	**	7,1%	**	10,1%	34,7%	6,4%	22,9%	7,3%	9,7%	12,8%
Ne collabore pas avec des adjoints au médecin	**	48,6%	**	50,4%	43,0%	45,6%	50,0%	45,1%	57,9%	48,0%
Ne collabore pas avec des diététistes et nutritionnistes	**	6,6%	**	11,2%	32,4%	17,9%	21,9%	28,9%	21,8%	16,1%
Ne collabore pas avec des ergothérapeutes	**	17,3%	**	46,0%	49,9%	3,4%	39,0%	11,2%	50,5%	30,1%
Ne collabore pas avec des physiothérapeutes	**	10,7%	**	35,4%	50,8%	,0%	29,4%	19,9%	40,4%	24,0%
Ne collabore pas avec des chiropraticiens	**	57,7%	**	56,4%	53,8%	46,7%	49,3%	55,9%	68,4%	55,4%
Ne collabore pas avec des psychologues	**	47,1%	**	41,5%	50,8%	46,9%	45,6%	53,8%	59,3%	47,1%
Ne collabore pas avec des conseillers en santé mentale	**	50,4%	**	48,9%	51,4%	51,3%	52,4%	53,5%	62,6%	51,8%
Ne collabore pas avec des conseillers en toxicomanie	**	55,1%	**	53,0%	54,0%	51,1%	54,6%	56,3%	60,5%	54,4%
Ne collabore pas avec des travailleurs sociaux	**	14,8%	**	22,7%	44,0%	23,7%	33,6%	47,2%	39,3%	26,6%
Ne collabore pas avec des pharmaciens	**	9,9%	**	13,6%	25,5%	16,2%	27,6%	31,3%	8,7%	16,3%
Ne collabore pas avec des sages-femmes	**	54,4%	**	28,5%	53,1%	51,6%	58,3%	64,5%	63,9%	49,9%
Ne collabore pas avec des orthophonistes	**	41,5%	**	57,5%	52,8%	51,5%	5,5%	54,4%	62,1%	46,4%
Ne collabore pas avec des podiatres	**	51,0%	**	57,8%	53,9%	48,0%	56,3%	47,4%	65,6%	54,4%
Ne collabore pas avec des praticiens de médecine complémentaire ou parallèle	**	55,1%	**	55,5%	47,0%	45,9%	54,2%	50,5%	62,1%	53,2%
NR aux questions ci-dessus	**	,0%	**	,8%	,7%	,4%	2,0%	,0%	,0%	,5%
Aucune collaboration	**	36,8%	**	33,1%	27,1%	37,0%	26,3%	27,1%	26,3%	32,5%

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.